

Hoja informativa sobre medicamentos

Ciprofloxacina (Cipro)



La ciprofloxacina (Cipro) es un antibiótico que se usa para tratar diferentes tipos de infecciones. Se usa para tratar infecciones causadas por el ántrax y la bacteria de la peste.

Si le han administrado ciprofloxacina (Cipro) o cualquier otro antibiótico de fluoroquinolona como Ofloxacina (Floxacin), Norfloxacina (Noroxin) o ácido nalidíxico (Neg-gram) en el pasado y tuvo una reacción o efecto secundario, es posible que se le administre otro antibiótico. Estos otros antibióticos son tan efectivos como la ciprofloxacina para prevenir infecciones.

Si está embarazada o amamantando, asegúrese de informar a los trabajadores de la salud en la clínica.

Informe al trabajador de la salud si está tomando algún medicamento para las convulsiones como **Dilantin, Fenobarbital, Tegretol o Carbatrol**, si está tomando Teofilina, probenecid (Benemid), Coumadin o Ciclosporina o cualquier medicamento que pueda comprar sin receta como aspirina, medicamento para el resfriado o sinusitis. Si está tomando alguno de estos medicamentos, debe consultar a su proveedor de atención primaria dentro de los tres a cinco días posteriores al inicio de los antibióticos.

Cómo tomar Ciprofloxacina:

- Se le dará un suministro de Ciprofloxacina. Si nos enteramos de que necesita tomar Ciprofloxacina durante un período de tiempo más prolongado, un trabajador de la salud se comunicará con usted.
- Tome Ciprofloxacina dos veces al día, con una diferencia de aproximadamente 12 horas.
- Tome este medicamento hasta que se terminen todas las pastillas o hasta que le indiquen que deje de hacerlo. Si deja de tomar este medicamento demasiado pronto, puede enfermarse.
- Lo mejor es tomar Ciprofloxacina dos horas antes o después de comer. Si siente malestar estomacal, tome el medicamento con alimentos, pero no lo tome con leche, yogur o queso.
- Tome Ciprofloxacina con un vaso lleno de agua. Beba varios vasos de agua cada día.
- Si olvida una dosis, tome Ciprofloxacina lo antes posible. Si es casi la hora de la próxima dosis (dentro de las tres horas), omita la dosis olvidada y tome la siguiente dosis a la hora habitual. No tome dos dosis a la vez.

Reacciones o efectos secundarios:

- **Efectos secundarios comunes:** náuseas, diarrea leve, dolor o malestar estomacal, dolor de cabeza, aturdimiento, mareos o somnolencia (**NO** conduzca un automóvil ni opere maquinaria si experimenta estos síntomas).
- La ciprofloxacina puede hacer que su piel sea más sensible al sol y puede quemarse más fácilmente durante varios meses después de terminar el medicamento. Lo mejor es mantenerse alejado del sol, evitar las lámparas solares y usar protector solar para proteger su piel.
- **Efectos adversos raros:** vómitos o diarrea intensa, desorientación, confusión, agitación, alucinaciones, fiebre, inflamación de los tendones.
- **Reacción alérgica:** erupción; urticaria; picazón, hinchazón de la cara, garganta o labios; falta de aliento o dificultad para respirar.
- Busque consejo médico si tiene alguna reacción a Cipro.

Evite los siguientes alimentos y medicamentos mientras toma Cipro:

No tome los siguientes medicamentos dentro de las dos horas de haber tomado Ciprofloxacina: antiácidos (Maalox, Mylanta, Tums) u otros medicamentos que contengan calcio; sucralfato (Carafate); vitaminas con suplementos de hierro o zinc. **No** debe tomar más de dos bebidas con cafeína (café, té, refrescos) por día mientras toma este medicamento. No tome Cipro con leche, yogur o quesos.

NO le dé su Cipro a ninguna otra persona.

NO le dé Cipro a niños sin una orden médica.

Si no entiende estas instrucciones o si desea obtener más información, comuníquese al trabajador de atención médica antes de abandonar el área de la clínica.

Para más información visite www.cdc.gov, o llame CDC en 800-CDC-INFO (English and Spanish) o 888-232-6348 (TTY).