

Hoja informativa sobre medicamentos

Doxiciclina



La doxiciclina es un antibiótico que se usa para tratar diferentes tipos de infecciones. Se usa para tratar infecciones causadas por el ántrax y la bacteria de la peste.

Si le han administrado doxiciclina u otros antibióticos de tetraciclina en el pasado y tuvo una reacción o un efecto secundario, es posible que le administren otro antibiótico. Estos otros antibióticos son tan efectivos como la doxiciclina para prevenir infecciones.

Si está embarazada o amamantando, asegúrese de informar a los trabajadores de la salud en la clínica.

Informe al trabajador de la salud si está tomando algún medicamento para las convulsiones, como Dilantin, Fenobarbital, Tegretol o Carbatrol, o si está tomando algún medicamento que pueda comprar sin receta, como aspirina, medicamento para el resfriado o sinusitis. Si está tomando alguno de estos medicamentos, debe consultar a su proveedor de atención primaria dentro de los tres a cinco días posteriores al inicio de los antibióticos.

Cómo tomar Doxiciclina:

- Se le dará un suministro de Doxiciclina para un día. Si nos enteramos de que necesita tomar Doxiciclina durante un período de tiempo más prolongado, un trabajador de la salud se comunicará con usted.
- Tome Doxiciclina dos veces al día, con aproximadamente 12 horas de diferencia. Asegúrese de tomar todos los medicamentos que le den en la clínica. Si deja de tomar Doxiciclina demasiado pronto, puede infectarse.
- Lo mejor es tomar Doxiciclina una hora antes o dos horas después de comer. Si siente malestar estomacal, tome Doxiciclina con alimentos. NO tome Doxiciclina con leche, yogur o queso.
- Tome la Doxiciclina con un vaso lleno de agua. Beba varios vasos de agua cada día.
- Si olvida una dosis, tome Doxiciclina tan pronto como lo recuerde. Si es casi la hora de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y tome la siguiente dosis a la hora habitual. NO tome dos dosis a la vez.

Reacciones o efectos secundarios:

- **Efectos secundarios comunes:** náuseas, diarrea leve, dolor de estómago, calambres o molestias, mareos (NO conduzca un automóvil ni opere maquinaria si experimenta estos síntomas).
- La Doxiciclina puede hacer que su piel sea más sensible al sol y puede quemarse más fácilmente durante varios meses después de terminar el medicamento. Lo mejor es mantenerse alejado del sol, evitar las lámparas solares y usar protector solar para proteger su piel.
- **Efectos adversos raros:** piel o dientes amarillentos o descoloridos, aumento de la frecuencia o cantidad de orina, dolor de cabeza, aumento de la sed, pérdida de apetito, vómitos, cambios visuales o debilidad muscular.
- Busque atención médica si tiene una reacción a la Doxiciclina.

Evite los siguientes alimentos y medicamentos mientras toma Doxiciclina:

No tome los siguientes medicamentos dentro de las dos horas anteriores o dos horas después de tomar Doxiciclina: antiácidos (Maalox, Mylanta, Tums) u otros medicamentos o alimentos que contengan calcio como leche, yogur o queso; vitaminas, suplementos de hierro o zinc; sucralfato (Carafate).

NO le dé su Doxiciclina a ninguna otra persona.

NO administre Doxiciclina a niños sin una orden médica.

Si no entiende estas instrucciones o si desea obtener más información, comuníquese al trabajador de atención médica antes de abandonar el área de la clínica.

Para más información visite www.cdc.gov, o llamar CDC en 800-CDC-INFO (English and Spanish) o 888-232-6348 (TTY).